



Dr. Kopeczky Ildikó

„1970-ben végeztem a POTE Általános Orvosi Karán. Ezt követően a Zala Megyei Kórház Gyermekosztályán dolgoztam. 1974-ben szereztem Csecsemő és Gyermekgyógyász szakvizsgámat. 10 évig újszülött osztályon dolgoztam, majd 1985-től a kórház gyermekosztályán, 1987-ben gyermek pulmonológus szakvizsgát szereztem, ezt követően 1992-ig megyei gyermek pulmonológiai feladatot is elláttam. 1992. márciusától főállású magánorvosként dolgozom, a fenti lehetőségekkel járóbeteg szakellátásban. Ezt követően akupunktúrás tanfolyamot végeztem, homepátia és iris diagnosztika témában tanfolyamot hallgattam, softlézer terápiában jártasságot szereztem. 2002-ben találkoztam a mágnesterápiával, azóta alkalmazom praxisomban.”

„Mágnesterápia - BEMER alkalmazása a gyermekgyógyászatban”

Eset ismertetés:

B.A. 2003. 06. 02.-án született, Gestációs diabétesz szövődményes terhességből, 38 gestációs hétre, természetes úton kimeneti vákuum extrakcióval. 3750 gramm súllyal. Köldökzsínór ph. 7,2. A köldökzsínór egyszer a nyakra volt csavarodva.



Neurológiai vizsgálat:

- bal felső végtag petyhüdten lóg a test mellett,
- ülésben toláskor, lebegő ültetéskor a bal felső végtagot nem emeli,
- mászatáskor a bal felső végtag nem mozdul, tónustalanul húzza a test mellett.

Az újszülött hat napos ápolás után fizioterápia és neurohabilitációs tréning javaslatával otthonába távozott.

A 2003. augusztus 1-i neurológiai vizsgálati leletből a következőket emelném ki:

- bal felső végtag változatlan, petyhüdten lóg a törzs mellett, befelé rotált, pronált helyzetben,
- bal felső végtagot ülésbetolásnál, lebegő ültetésnél nem emeli,
- mászaskor a bal felső végtag nem mozdul.

A csecsemő állapota a fentiek megfelelő volt első találkozásunkkor.

Az első hét tapasztalata:

- az ujjakban finom mozgás kezdődik.

Az első hónap tapasztalata:


- kevésbé feltűnő már a születéskori bénulás



A második hónap végén:

- bal karját spontán vállmagasságig emeli

Eddig tartott a rendszeres BEMER kezelés.



A 2004. február 27-i neurológiai vizsgálat alapján:

- tárgyakért mindkét kézzel nyúl,
- bal felső végtagot váll fölé emeli,
- szorító erő kezeiben egyforma.



További tapasztalatok:

- 12 gyermeknél (4-14 éves korú), akik ismételt légúti fertőzésben, részben **allergiás asztmában szenvedtek** alkalmaztam BEMER kezelést. **Panaszaik lényegesen csökkentek, a betegségek gyakorisága úgyszintén mérséklődött.**
- Alvászavarban, és hiperaktivitásban is jó eredményt tapasztaltam.
- A csonttörések, és különböző felületi sebek kezelésében a BEMER alkalmazása gyorsította a gyógyulást, csökkentette a fájdalmat is.

Az eddigi tapasztalataim alapján **ezen kezelési módnak fontos szerepet tulajdonítok a gyermekgyógyászati munkában** sokat emlegetett **prevenció területén és kiegészítő kezelésként a fent említett kórképekben.**

